

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 23-2-68 752781

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

11, Rue de la Vigilance — 69 - LYON 3°  
Tél. 60-66-24 et 60-69-55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17  
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.  
51, Av. Maréchal-Foch - LYON 6°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Supplément au bulletin N° 89 de février 1968

21 février 1968

page 5

### ABONNEMENTS

Nous rappelons que les abonnements non renouvelés au 28 février cesseront d'être servis dans le courant du mois de mars.

### ARBRES FRUITIERS

CLOQUE DU PECHER - Des contaminations ont pu déjà se produire dans le sud de la région à la faveur des pluies du 15 sur les plantations non protégées. Dans les autres régions, nous attirons l'attention sur l'urgence du traitement de la cloque partout où il n'aurait pas encore été appliqué.

MONILIA DE L'ABRICOTIER - Un premier traitement fongicide doit être déjà en place à l'apparition du rouge des sépales. Il est souvent nécessaire de le renouveler avant l'ouverture des premières fleurs, principalement en cas de pluies répétées de développement très lent de la végétation.

### V I G N E

ESCA - Cette maladie peut présenter soit une évolution lente n'intéressant souvent qu'une partie de la souche, soit une forme brutale (apoplexie) qui se caractérise par le flétrissement rapide du feuillage. La souche attaquée meurt brutalement en juillet, août pendant les fortes chaleurs. La pulvérisation d'une solution à base d'arsénite de soude à la dose de 1250gr d'arsenic par hl. d'eau, soit 5 litres de spécialité commerciale titrant 250gr.d'arsenic par litre donne de bons résultats; ce traitement doit être effectué au moins 10 jours après la taille et avant le gonflement des bourgeons. Il est conseillé de traiter deux années de suite.

Pulvériser abondamment sur les plaies de taille récentes et anciennes, avec un pulvérisateur muni d'un jet à cône étroit, en évitant les bois de taille pour ne pas brûler les bourgeons.

L'arsénite de soude étant un produit très toxique, il convient de prendre toutes les précautions voulues au cours du traitement: ne pas traiter par grand vent, s'abstenir de fumer, porter des gants de caoutchouc si l'on a des gerçures ou des écorchures aux mains.

### CULTURES DIVERSES

CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA - Un traitement par poudrage ou pulvérisation devra être appliqué dès que la température à l'ombre aura dépassé 14°. La poussée chaude du 14 février (16° à Lyon) n'a déclenché dans le sud de la région qu'une activité de courte durée en raison du refroidissement qui a suivi.

### PRODUITS CONSEILLES

Nos abonnés trouveront avec ce bulletin la liste des matières actives conseillées en 1968 pour lutter contre un certain nombre de maladies et de ravageurs. Vous conserverez soigneusement cette liste, car le bulletin y fera très souvent référence. De toutes façons, vous devrez vous y reporter chaque fois que les produits de traitement ne seront pas indiqués sur le bulletin.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux: A.PITHIUD

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles: P.LATARD